

ระดับความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าจากลักษณะการสัมผัสกับสัตว์และการปฏิบัติ

ระดับความเสี่ยง	ลักษณะการสัมผัส	การปฏิบัติ
กลุ่มที่ ๑ การสัมผัสที่ไม่ติดโรค	<ul style="list-style-type: none"> - ถูกต้องตัวสัตว์บ่อนอาหาร โดยผิวหนังไม่มีแผลหรือรอยถลอก - ถูกเลีย สัมผัสน้ำลายหรือเลือดสัตว์โดยผิวหนังไม่มีแผลหรือรอยถลอกขีดข่วน 	ล้างบริเวณสัมผัสไม่ต้องฉีดวัคซีน
กลุ่มที่ ๒ การสัมผัสที่มีโอกาสติดโรค	<ul style="list-style-type: none"> - ถูกจับเป็นรอยข่วนที่ผิวหนัง ไม่มีเลือดออก หรือ เลือดออกชิบ ๆ - ถูกข่วนที่ผิวหนังเป็นรอยถลอก (Abrasion) มีเลือดออกชิบ ๆ - ถูกเลียโดยที่ผิวหนังมีแผลหรือรอย ถลอกหรือรอยขีดข่วน 	ล้างและรักษาแผล ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
กลุ่มที่ ๓ การสัมผัสที่มีโอกาสติดโรคสูง	<ul style="list-style-type: none"> - ถูกกัด โดยฟันสัตว์แทงทะลุผ่านผิวหนังแผลเดียวหรือหลายแผล และมีเลือดออก (Laceration) - ถูกข่วน จนผิวหนังขาดและมีเลือดออก - ถูกเลีย หรือน้ำลาย สิ่งคัดหลั่ง ถูกเย็บของตา ปาก จมูก หรือ แผลที่มีเลือดออก - มีแผลที่ผิวหนัง และสัมผัสสารคัดหลั่งจากร่างกาย สัตว์ ซากสัตว์เนื้อสมองสัตว์รวมทั้ง การชำแหละ ซากสัตว์และลอกหนังสัตว์ - กินอาหารดิบที่ปรุงจากสัตว์หรือผลิตภัณฑ์จาก สัตว์ที่เป็นโรคพิษสุนัขบ้า 	ล้างและรักษาแผล ฉีดวัคซีนและอิมมูโนโกลบูลิน โดยเร็วที่สุด

โรคพิษสุนัขบ้า

Rabies



ภัยเงียบใกล้ตัว ป้องกันได้!

ถูกกัด
ถูกข่วน
อย่ารอ!!!



รู้จักโรคพิษสุนัขบ้า

เป็นโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน เกิดจากเชื้อไวรัส Rabies ติดต่อน้ำลายของสัตว์เลียขูดด้วยนมที่ติดเชื้อ เช่น สุนัข แมว ผ่านการกัด ข่วน หรือเลียบริเวณที่มีบาดแผล ทั้งนี้ เมื่อผู้ป่วยแสดงอาการทางระบบประสาทแล้ว มีอัตราการเสียชีวิต ร้อยละ 100



สถานการณ์ในประเทศไทย (1 มกราคม-25 กุมภาพันธ์ 2569)

ผู้ป่วย 2 ราย เสียชีวิตทั้ง 2 ราย
(ทั้ง 2 จังหวัด เคยมีการรายงานผู้ป่วยยืนยันในปี 2568)

การเฝ้าระวังจากกรมปศุสัตว์ (25 กุมภาพันธ์ 2568-25 กุมภาพันธ์ 2569)

ตรวจพบเชื้อในสุนัข **84%** ของสุนัขที่สุ่มตรวจ เป็นสุนัขและแมวที่มีเจ้าของ **43%**



ปัจจัยเสี่ยงของผู้เสียชีวิต

- ⚠️ **ไม่ได้รับวัคซีน** หลังถูกสัตว์กัด/ข่วน
- ⚠️ **ไม่ได้ล้างแผล** หรือทำความสะอาดแผลไม่ถูกวิธี
- ⚠️ **สัมผัสสัตว์ที่ไม่ได้รับวัคซีน** หรือไม่ทราบประวัติการได้รับวัคซีนของสัตว์



การป้องกัน

- ✓ **ฉีดวัคซีนสัตว์เลี้ยง**
นำสุนัขและแมวไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเป็นประจำทุกปี
- ✓ **ควบคุมสัตว์เลี้ยง**
ใส่สายจูงเมื่อนำสัตว์เลี้ยงออกนอกบ้าน
- ✓ **หลีกเลี่ยงการสัมผัส**
อย่าเข้าใกล้หรือเล่นกับสัตว์ที่ไม่รู้จักหรือสัตว์ที่มีอาการผิดปกติ
- ✓ **แจ้งเจ้าหน้าที่**
หากพบสัตว์ไม่ทราบแหล่งที่มา หรือสัตว์มีอาการผิดปกติในพื้นที่ชุมชน ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์/สาธารณสุข/เทศบาลในพื้นที่ทันที

"ล้างแผล ใส่ยา กักหมา หามอ ฉีดวัคซีนให้ครบ" เมื่อถูกกัด/ข่วน

ล้างแผลทันที : ล้างแผลด้วยสบู่และน้ำสะอาดอย่างน้อย 15 นาที ให้เข้าถึงรอยลึกของแผล

ใส่ยาฆ่าเชื้อ : เช่น โพรโดน-ไอโอดีน (เบตาดีน)

กักสัตว์ : กักสัตว์ที่กัด/ข่วนไว้สังเกตอาการ 10 วัน หากสัตว์ตายให้นำซากไปตรวจ

พบแพทย์ทันที : เพื่อประเมินความเสี่ยงและรับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (และอาจต้องรับเซรุ่ม) แม้แผลจะเล็กน้อยก็ตาม **ต้องฉีดให้ครบตามนัด!**



อาการเริ่มต้น

มักมีอาการไม่จำเพาะ ได้แก่ มีไข้ ชา/เสียว/ปวดแสบร้อน หรือรู้สึกคันผิดปกติบริเวณแผลที่ถูกกัดหรือข่วน

อาการทางระบบประสาท

แบบคลุ้มคลั่ง : กระวนกระวาย กลัมน้ำ กลัวม กลืนลำบาก น้ำลายไหลมาก
แบบอัมพาต : กล้ามเนื้ออ่อนแรง เริ่มจากบริเวณที่ถูกกัด



ที่มา : กลุ่มพัฒนาระบบเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาโรคติดต่อ กองระบาดวิทยา ข้อมูล ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569

ddc.moph.go.th/doe



กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค

สายด่วน
1422

เผยแพร่ :
4 มีนาคม 2569

หนองคาย "เมืองน่าอยู่ มุ่งสู่เกษตรอินทรีย์ ท่องเที่ยววิถีสุน้ำโขง เชื่อมโยงการค้าชายแดน"